




# Комплексная система защиты сахарной свёклы препаратами Байер КрокСайенс



Фазы развития ▶	00	05	10	12	14	16	18	35	49	Вредные объекты	Примечания
<b>ПОПЫЛКА</b> ПОНЧО БЭТА	0,075-0,15 л/п.е		○	○	○	○	○	○	○	комплекс вредителей всходов, включая почвообитающих	протравливание семян
<b>КОСЫЛКА</b> ДЕЦИС ПРОФИ	○	○	0,03-0,05 кг/га					○	○	комплекс вредителей	по ситуации
<b>ПОСЛЕКОС</b> Фуроре	○	○	0,5-0,75 л/га					○	○	однолетние злаковые сорняки	
<b>ПОСЛЕКОС</b> Пантера	○	○	0,75-1,5 л/га					○	○	однолетние и многолетние злаковые сорняки	
Вариант А – каждые 7-10 дней по семядолям сорняков											
<b>ПОСЛЕКОС</b> Бетанал Эксперт ОФ ИЛИ Бетанал Прогресс ОФ	○	○	1,0 л/га	1,0 л/га	1,0 л/га				○	однолетние двудольные сорняки	при высоком уровне агротехники
Вариант В – каждые 7-10 дней по семядолям сорняков											
<b>ПОСЛЕКОС</b> Бетанал Эксперт ОФ ИЛИ Бетанал Прогресс ОФ	○	○	1,25 л/га	1,5 л/га					○	однолетние двудольные сорняки	при среднем уровне агротехники
<b>ПОСЛЕКОС</b> Бетанал 22	○	○				1,5 л/га			○		
Вариант С – каждые 7-10 дней по семядолям сорняков											
<b>ПОСЛЕКОС</b> Бетанал Эксперт ОФ ИЛИ Бетанал Прогресс ОФ	○	○	1,25 л/га						○	однолетние двудольные сорняки	при сильной засоренности степени
<b>ПОСЛЕКОС</b> Бетанал 22	○	○		1,5 л/га	1,5 л/га				○		
Первая обработка при появлении болезней, вторая через 14 – 16 дней											
<b>СПЕЛКА</b> ФАЛЬКОН	○	○	○	○	○	○	0,5-0,6 л/га		○	церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	1-я обработка по симптомам болезней, 2-я профилактическая